



SCHOKOLADENBABY

YORKI AKADEMIA



Az élősködők elleni rendszeres védekezés minden yorkshire terrier egészségének az egyik legfontosabb alappillére. A külső és belső élősködők nemcsak kellemetlenséget okoznak, hanem súlyos betegségeket is terjeszthetnek, ezért a megelőzésre egész évben érdemes odafigyelni.



KÜLSŐ ÉLŐSKÖDŐK



KULLANCS

Nem minden kullancs fertőzőtt, azonban egy fertőzőtt kullancs súlyos betegségeket adhat át kutyáknak.

Az egyik legismertebb ilyen betegség a babéziózis (babézia), amely gyors állatorvosi ellátást igényel.

A kullancsok nem ugranak és nem repülnek. A fűszálakról és bokrokról kapaszkodnak rá a kutyára, ezért minden séta után érdemes alaposan átvizsgálni kedvencünket, különösen:

- a fülek környékét
- a nyakat
- a hónaljat
- a lábujjak között
- az ágyék területét



Ha kullancsot találunk, minél előbb távolítsuk el kullancseltávolító eszközzel.



BOLHA

A bolhák nemcsak viszketést okoznak. Terjeszthetnek galandférget, allergiás bőrgyulladást, nagyobb fertőzöttség esetén pedig akár vérszegénységet is. Ha bolhát találunk kutyánkon, ne csak öt kezeljük, hanem a fekhelyét, takaróit és a környezetét is, hiszen a bolhák petéinek és lárváinak nagy része nem az állaton, hanem a környezetben található.



SZÚNYOG

A szúnyogok nemcsak kellemetlen csípéseket okoznak. Magyarországon is terjeszthetik a szívférgességet és a bőrférgességet, ezért a megfelelő védekezés kiemelten fontos.



MILYEN TŰNETERRE FIGYELJÜNK? (BABÉZIA)

A kullancscsípést követően néhány nappal vagy akár 1-3 héten belül is jelentkezhetnek tünetek.

- bágyadtság
- étvágytalanság
- magas láz
- gyors kifáradás
- sötétbarna vagy vörösbarna vizelet
- sápadt vagy sárgás íny
- gyengeség
- neheztett mozgás



Ha ezek közül bármelyik tünetet észleljük, különösen kullancscsípést követően, azonnal forduljunk állatorvoshoz!

A babéziózis időben felismerve jól kezelhető, késlekedés esetén azonban életveszélyessé válhat.



BELSŐ ÉLŐSKÖDŐK

A bélférgek sok esetben hosszú ideig tünetmentesen is jelen lehetnek.

Figyelmeztető jelek lehetnek:

- hasmenés
- fogyás
- puffadt has
- fénytelen szőrzet
- férgek vagy féregizék a bélsárban



A rendszeres féreghajtás nemcsak kutyánk egészsége miatt fontos. Egyes bélférgek zoonózisok, vagyis állatról emberre is átterjedhetnek, ezért a megelőzés családunk egészségét is védi.



HOGYAN VÉDEKEZZÜNK?

Ma már többféle készítmény áll rendelkezésre:



tabletta



spot-on
csepp



nyakörv



kombinált
készítmények

Mindig kérjük ki állatorvosunk tanácsát, hogy kutyánk életkorának, testtömegének és életmódjának megfelelő készítményt válasszunk.

♥ SCHOKOLADENBABY TENYÉSZTŐI TAPASZTALAT

FÉREGHAJTÁSI PROGRAMUNK:

- 4 hetes kortól kezdjük a féreghajtást.
- Ezt követően 2 hetente ismételjük egészen 12 hetes korig.
- 12 hetes kor után pedig 3 havonta (negyedévente) javasoljuk a rendszeres féreghajtást.

Kennelünkben erre a célra FERDOCAT® készítményt használunk.



Azért választottuk ezt a készítményt, mert nemcsak a leggyakoribb bélférgek ellen nyújt védelmet, hanem egyes protozoozók ellen is hatékony lehet, például a sajnos egyre gyakrabban előforduló Giardia ellen is.

A külső élősködők elleni védekezésre kennelünkben az ADVOCATE® spot-on cseppeket használjuk.



Tapasztalataink szerint ez kiváló választás, mert már 7 hetes kortól és legalább 1 kg testtömegtől alkalmazható (az állatorvos javaslata alapján), így a legkisebb yorkshire terrierek védelmét is időben megkezdhetjük.

Az Advocate® többféle külső és belső élősködő ellen nyújt védelmet, valamint a szívférgesség megelőzésében is fontos szerepet játszik.

Természetesen minden kutya egyedi, ezért a megfelelő készítmények kiválasztását és alkalmazását mindig állatorvossal egyeztessük.



TUDDAD?

A bolhák egész évben jelen lehetnek, még lakásban tartott kutyáknál is. A kullancsok pedig már az enyhébb téli napokon is aktívvá válhatnak, ezért a védekezést nem csak tavasszal és nyáron fontos alkalmazni.



♥ GAZDI EMLÉKEZTETŐ

A legjobb kezelés mindig a megelőzés. A rendszeres élősködők elleni védekezéssel sok súlyos betegség megelőzhető, így yorkshire terrierünk hosszú, egészséges és boldog életet élhet.



IVARTALANÍTÁS VAGY NEM IVARTALANÍTÁS?



SCHOKOLADENBABY

YORKI AKADEMIA




Az ivartalanítás az egyik leggyakoribb kérdés, amellyel a kutyatartók találkoznak. Nincs egyetlen, minden kutyára érvényes válasz, hiszen a döntést befolyásolja a kutya neme, életkora, egészségi állapota, életmódja és az is, hogy tenyésztésre szánjuk-e. Ezért mindig érdemes állatorvossal egyeztetni, mielőtt döntést hozunk.

MIKOR JAVASOLT AZ IVARTALANÍTÁS?

Az ivartalanítást sok állatorvos javasolja olyan kutyáknál, amelyeket nem szetya neme, tenyésztésbe vonni.

- megelőzhető a nem kívánt szaporulat
- csökkentheti bizonyos ivarszervi betegségek kialakulásának kockázatát
- szukáknál jelentősen csökkentheti a gennyes méhgyulladás (pyometra) kialakulásának esélyét
- megfelelő időzítés esetén csökkentheti egyes emlődaganatok kialakulásának kockázatát
- megszünteti az ismétlődő álvemhességet
- kanoknál csökkentheti egyes prosztatabetegségek előfordulását



MIKOR NEM FELTÉTLENÜL SZÜKSÉGES?

Ha kutyánk egészséges, felelősen tartjuk, és biztosan nem kerül nem kívánt párosításra, akkor az ivartalanítás időzítéséről vagy szükségességéről mindig egyéni mérlegelés alapján érdemes dönteni. Minden kutya más, ezért nincs minden helyzetre egyformán megfelelő megoldás.

MIRE SZÁMÍTHATUNK IVARTALANÍTÁS UTÁN?

Az ivartalanítás után a kutya szervezetében hormonális változások következnek be, amelyek bizonyos testi és viselkedésszerű változásokkal is járhatnak.

Ha az ivartalanítás a nemi érés előtt vagy annak kezdetén történik, előfordulhat, hogy a másodlagos nemi jellegek kevésbé alakulnak ki.

KAN KUTYÁKNÁL PÉLDÁUL:

- ✓ kisebb eséllyel alakul ki a területjelölő vizeletürítés
- ✓ csökkenhet a szökési hajlam a tüzelő szukák után
- ✓ mérséklődhet az ivari hormonok által befolyásolt viselkedés

Fontos azonban tudni, hogy a már kialakult, tanult viselkedésminták nem minden esetben szűnnek meg az ivartalanítás után.

FIGYELJÜNK RÁ:

- az adagok felülvizsgálata
- szükség esetén ivartalanított kutyáknak készült táp etetése
- rendszeres mozgás
- a testsúly folyamatos ellenőrzése



TÉVHIT VAGY VALÓSÁG?

TÉVHIT:

- „Minden szukának legalább egyszer fialnia kell.”

VALÓSÁG:

Erre nincs tudományos bizonyíték. Egy szukának nem szükséges almot nevelnie ahhoz, hogy egészséges és kiegyensúlyozott életet éljen. A tenyésztés mindig tudatos, átgondolt döntés legyen, amelyet kizárólag egészséges, megfelelő genetikai háttérrel rendelkező és tenyésztésre alkalmas kutyákkal szabad végezni.



SCHOKOLADENBABY TENYÉSZTŐI SZEMLÉLET

Kennelünkben minden kölyökkutya IHR törzskönyvvel rendelkezik.

Azokat a kölyköket, akik családi kedvencként kerülnek új otthonukba, nem tenyésztési célra értékesítjük. Ezeknél a kutyáknál az IHR törzskönyvet az ivartalanítás megtörténtét követően adjuk át a gazdinak.

Ezzel a gyakorlattal a felelős kutyatartást és a tudatos tenyésztést szeretnénk támogatni, hogy tenyésztésbe csak olyan kutyák kerüljenek, amelyek egészségügyi, genetikai és küllemi szempontból is megfelelnek a fajta elvárásainak.

SCHOKOLADENBABY TENYÉSZTŐI TANÁCS

A TÖRZSKÖNYV ÖNMAGÁBAN NEM JELENT TENYÉSZTÉSI JOGOSULTSÁGOT.

A törzskönyv a kutya származását igazolja, azonban a felelős tenyésztés ennél jóval többet jelent.

- elengedhetetlen az egészségügyi és genetikai szűrések elvégzése
- megfelelő küllem
- kiegyensúlyozott idegrendszer
- a fajta alapos ismerete

Kennelünk célja nem a szaporítás, hanem egészséges, kiegyensúlyozott és a fajta-standardnak megfelelő yorkshire terriernek tenyésztése, hogy kölyökkutyáink hosszú, boldog életet élhessenek új családjuk körében.



TUDDAD?

Az álvemhesség gyakori jelenség az ivaros szukáknál. Ilyenkor a kutya vemhesnek hisheti magát, játékokat vagy plüssöket „kölykeiként” őrizhet, tejelválasztás is jelentkezhet, és viselkedése megváltozhat. Ha ezek a tünetek rendszeresen visszatérnek vagy nagyon kifejezettek, érdemes állatorvossal konzultálni az ivartalanítás megfelelő időpontjáról.



GAZDI EMLÉKEZTETŐ

Az ivartalanítás kérdésében nincs minden kutyára érvényes, egyetlen jó döntés.

A legjobb döntés mindig az, amelyet kutyánk egészségi állapotát, életmódját és állatorvosunk szakmai tanácsát figyelembe véve hozunk meg.



MIKOR MENJÜNK ÁLLATORVOSHOZ?

Vannak olyan jelek, amelyeket nem szabad félvállról venni. Egyes esetekben az azonnali állatorvosi ellátás életet menthet, máskor pedig a mielőbbi vizsgálat segít megelőzni a komolyabb problémákat.

A yorkshire terrierek kis testméretük miatt gyorsabban romolhat az állapotuk, ezért fontos, hogy időben felismerjük a figyelmeztető jeleket.



SCHOKOLADENBABY
YORKI AKADEMIA



ÁZONNAL FORDULJUNK ÁLLATORVOSHOZ, HA KUTYÁNK:

- nehezen kap levegőt vagy fullad
- eszméletét veszti vagy őszeesik
- görcsrohamot kap
- mérgezés gyanúja merül fel
- idegen tárgyat nyelt le
- nem tud felállni vagy hirtelen lebénul
- súlyos balesetet szenvedett
- erősen vérzik
- magas láza van
- erős fájdalom jeleit mutatja
- többször hány vagy hasmenése van rövid időn belül
- véres hányása vagy véres hasmenése jelentkezik
- nem tud vizeletet üríteni
- hirtelen kialakuló allergiás reakció (ödéma) jelentkezik



ALLERGIÁS REAKCIÓ (ÖDÉMA)

Figyelmeztető tünetek:

- az arc vagy a pofa hirtelen duzzanata
- a szemhéjak duzzanata
- csalánkiütés
- erős viszketés
- nehéztett légzés
- bágyadság

Ha kutyánk arca vagy torka hirtelen megduzzad, illetve nehezen kap levegőt, az életveszélyes állapot lehet. Azonnal induljunk állatorvoshoz!



MÉRGEZÉS GYANÚJA ESETÉN

Ne várjunk a tünetek megjelenésére!

Azonnal hívjuk fel állatorvosunkat.

Gyakori mérgező anyagok:

- csokoládé
- xilit (nyírfacukor)
- szőlő és mazsola
- hagyma és fokhagyma
- gyógyszerek
- patkányméreg
- egyes szobanövények



HÁNYÁS ÉS HASMENÉS

Mielőbb állatorvosi vizsgálat szükséges, ha:

- a hányás ismétlődik
- a kutya bágyadt
- nem iszik
- kölyökkutyáról van szó
- vér látható a hányásban vagy a bélsárban
- 24 órán belül nem javul az állapota



LÁZ

A kutya normál testhőmérséklete 38,0–39,0 °C. Ha a testhőmérséklet 39,5 °C felett van, vagy kutyánk bágyadt, étvágytalan és rossz az általános állapota, forduljunk állatorvoshoz.



HIPGLIKÉMIA (KÖLYÖKNÉL)

Figyelmeztető jelek: bágyadság, remegés, bizonytalan járás, aluszékonyság, acetonszagú lehelet. Elsősegélyként kevés mézet vagy cukros vizet adhatunk, majd haladéktalanul állatorvoshoz kell fordulni.

NEM MINDEN SÜRGŐSSÉGI, DE MIELOBBI ÁLLATORVOSI VIZSGÁLAT SZÜKSÉGES



VAKARÓZÁS

Tartós vagy erős vakarózás esetén allergia, bolha, atka vagy bőrbetegség is állhat a háttérben.



SZÁNKÁZÁS

Leggyakrabban a bűzmirigy teltsége vagy gyulladás okozza, de bélférgesség is állhat a háttérben.



BÜZMIRIGY

Kellemetlen szag, fájdalom, duzzanat vagy tályog kialakulása esetén állatorvosi ellátás szükséges.



SEB, TÁLYOG

A fertőzések gyorsan súlyosbodhatnak, ezért minden seb, gennyes seb vagy tályog kezelést igényel.



SZEMELVÁLTOZÁS

Piros szem, váladékozás, hunyorgás, fokozott könnyezés, tartós szemfolyás vagy sérülés esetén vizsgáltsuk meg.



FÜLELVÁLTOZÁS

Kellemetlen szag, fülvándék, fejrázás, fülvakarás vagy fájdalommasság fülgyulladásra utalhat.



TOKLÁSZ GYANÚJA

Hirtelen sántítás, mancsnyalogatás, tüszőgég, orrfolyás, fejrázás vagy fülvakarás esetén keressük fel az állatorvost.



PATELLAFICAM

Visszatérő sántítás vagy három láb ugrálás esetén kivizsgálás javasolt.



BENT MARADT TEJFOG

Ha a maradott fog már kinőtt, de a tejfog még nem esett ki, állatorvosi vizsgálat javasolt, mert harapási rendellenességet okozhat.



FOGKÓ ÉS SZÁJÜREGI PROBLÉMÁK

Kellemetlen szájíz, fogkó, vérző íny, rágási nehézség vagy kilazult fogak esetén keressük fel állatorvosunkat. A fogkó eltávolítását ultrahangos fogkó-eltávolítással, altatásban végzik.



MIT VIGYÜNK MAGUNKKÁL?

- az oltási könyvet vagy kisállat útlevélet
- a kutya által szedett gyógyszereket
- a lenyelt tárgy vagy mérgező anyag csomagolását
- egy friss bélsármintát, ha azt az állatorvos kéri



SCHOKOLADENBABY TENYÉSZTŐI TANÁCS

Ha bizonytalanok vagyunk, inkább telefonáljunk az állatorvosnak egyszer többet, mint egyszer későn. A yorkshire terrier kis testmérete miatt néhány óra alatt is sokat romolhat az állapota, ezért a gyors reakció sok esetben életmentő lehet.



TUDDAD?

A kutyák ösztönösen igyekeznek elrejtetni a fájdalmukat. Mire egy yorkshire terrier látványosan rosszul érzi magát, előfordulhat, hogy már komoly segítségre van szüksége.



MIT NE TEGYÜNK?

- Ne adjunk emberi gyógyszert saját döntés alapján.
- Ne várjunk napokig arra, hogy „majd elmúlik”.
- Ne próbáljuk internetes tanácsok alapján kezelni a súlyos tüneteket.
- Ne hánytassuk a kutyát állatorvosi utasítás nélkül, mert bizonyos mérgezők vagy lenyelt tárgyak esetén ez veszélyes lehet.



GAZDI EMLÉKEZTETŐ

A legjobb gazdi nem az, aki minden betegséget felismer, hanem az, aki időben segítséget kér.

Ha úgy érzed, hogy valami nincs rendben a kutyáddal, bízz a megérzéseidben, és kérd ki állatorvos véleményét.

Az időben megkezdett kezelés sokszor a legfontosabb lépés kedvencünk egészségének megőrzésében.



KÖVETKEZŐ RÉSZ:

24. rész – Otthoni elsősegélynyújtás alapjai



ELSŐSEGÉLY otthon

Balesetek és kisebb sérülések
bármikor előfordulhatnak.
A nyugodt, felkészült gazdi
sokat segíthet kutyájának.

MIT ÉRDEMES OTTHON TARTANI?



- steril gézlap
- rugalmas pólya
- öntapadó kötszer
- állatorvos által javasolt fertőtlenítő oldat
- csipesz
- kullancseltávolító



- tompá végű olló
- digitális lázmérő (csak a kutya számára)
- gumikesztyű
- méz vagy kristálycukor hipoglikémia esetére
- az állatorvos telefonszáma

KISEBB VÉRZÉS ESETÉN



Maradjunk nyugodtak.
Tiszta gézlappal néhány percig gyakoroljunk enyhe nyomást a sebre.
Ha a vérzés nem csillapodik vagy erős, azonnal forduljunk állatorvoshoz.

KISEBB SÉRÜLÉSEK



A felületet sebet óvatosan tisztítsuk meg az állatorvos által javasolt fertőtlenítővel. Ha a seb mély, harapott, erősen szennyezett vagy gennyes, mindig állatorvos lássa el.



LÁZ MÉRÉSE

A kutya testhőmérsékletét végbélben mérjük.

Normál érték: **38,0–39,0 °C**

Ha a testhőmérséklet **39,5 °C felett van**, vagy kutyánk bágyadt, étvágytalan és rossz az általános állapota, keressük fel állatorvosunkat.



ROVARCSÍPÉS

Enyhébb esetben figyeljük kutyánkat.
Ha duzzanat, neheztelt légzés vagy bágyadság jelentkezik, azonnal forduljunk állatorvoshoz.



HIPOGLIKÉMIA KÖLYÖKKUTYÁKNÁL

Tünetek: bágyadság, remegés, bizonytalan járás, aluszékonyság, acetonos lehelet.
Elsősegélyként adjunk a kutya szájába egy kiskanál mézet.
Ha nincs otthon méz, egy kevés kristálycukor is segíthet átmenetileg megemlíni a vércukorszintet.
Ezután tartsuk melegen a kölyköt, és haladéktalanul vigyük állatorvoshoz, mert a hipoglikémia életveszélyes állapot lehet.



MIT TARTHATUNK OTTHON?

(ÁLLATORVOSUNKKAL ELŐRE EGYEZTETVE)

- Bolus Adstringens** – enyhébb hasmenés esetén, ha a kutya jókedvű, nem bágyadt, nem hány, és valószínűleg valami számára nem megfelelő dolgot evett.
- Probiotikum** – segíthet a bélflóra helyreállításában hasmenés vagy antibiotikum-kezelés után.
- Stresszoldó készítmény** – tűzijáték, vihar vagy utazás előtt az állatorvos által ajánlott készítmény segíthet a szorongás csökkentésében.
- Calo-Pet energiazselé** – műtét után, legyengült állapotban vagy hipoglikémia veszélye esetén gyors energiaforrásként alkalmazható az állatorvos javaslata alapján.



TŰZIJÁTÉK ÉS HANGOS ZAJOK

Segíthetünk kedvencünknek:

- biztosítsunk számára nyugodt, biztonságos búvóhelyet
- húzzuk be a függönyöket, csökkentsük a külső zajokat
- kapcsoljunk be halk zenét vagy a televíziót
- alkalmazhatunk szorongáscsökkentő kötést (body wrap), amely enyhe, egyenletes nyomást gyakorol a kutya testére. Ez sok kutyánál megnyugtató hatású. Ilyen például a Thundershirt, de más hasonló kialakítású mellény is megfelelő lehet.
- szükség esetén az állatorvos által javasolt stresszoldó készítmény is alkalmazható.

! Tűzijáték idején soha ne engedjük szabadon a kutyát, és pórázon is fokozottan figyeljünk rá, mert ijedtében könnyen elszaladhat.



BIZTONSÁGOS SZÁLLÍTÁS

Sérült kutyát mindig óvatosan emeljük fel. Ha fájdalmai vannak, előfordulhat, hogy ijedtében odakaphat.
Kisebb yorkit puha takaróba csavarva biztonságosan szállíthatunk.



LEGYEN MINDIG KÉZNÉL!

állatorvos telefonszáma
legközelebbi állatkórház elérhetősége
oltási könyv vagy kisállat útlevele
a kutya rendszeresen szedett gyógyszerei



TUDDAD?

A kutyák fájdalomtünetre képesége kiváló, ezért gyakran csak későn mutatják a fájdalom jeleit. Éppen ezért minden szokatlan viselkedést vagy tünetet érdemes komolyan venni.



MIT SOHA NE TEGYÜNK?

- Ne adjunk emberi gyógyszert saját döntés alapján.
- Ne használjunk alkoholt vagy hidrogén-peroxidot sebkezelésre, hacsak azt állatorvos nem javasolja.
- Ne próbáljuk visszahelyezni a ficamot vagy a törött csontot.
- Ne etessük vagy itassuk erőszakkal az eszméletlen kutyát.
- Ne hánytassuk a kutyát állatorvosi utasítás nélkül.
- Ne halogassuk az állatorvosi vizsgálatot, ha kutyánk állapota romlik.



GAZDI EMLÉKEZTETŐ

Az elsősegély célja nem a gyógyítás, hanem az állapot stabilizálása addig, amíg kedvencünk állatorvoshoz kerül. A legjobb elsősegély a felkészültség, a nyugodt gondolkodás és az időben kért szakmai segítség.



AZ IDŐSÖDŐ YORKI GONDOZÁSA

A szeretet sosem öregszik...

A yorkshire terrierek megfelelő gondoskodás mellett 14–16 évig, vagy akár tovább is élhetnek.

Az évekkel együtt igényeik változnak, de a szeretetük ugyanolyan marad.



Mikor számít idősnek?



7–8 éves kortól
már senior korba lép.

Ez nem azt jelenti, hogy beteg lesz, de ettől az időszaktól fokozottan figyeljünk rá.



Állatorvosi ellenőrzés



- ✓ Testsúly ellenőrzése
- ✓ Fogazat vizsgálata
- ✓ Szív és tüdő működése
- ✓ Vérvizsgálat
- ✓ Vizeletvizsgálat
- ✓ (Vérnyomás, ha szükséges)

Évente legalább egyszer,
idősebb kutyáknál félévente.



Táplálás

- ♥ Jó minőségű senior táp
- ♥ Megfelelő fehérjebevitel
- ♥ Ideális testsúly megőrzése
- ♥ Mindig friss ivóvíz legyen

A mérték a kulcs!

Mozgás



- ✓ Rövidebb, de gyakoribb séták
- ✓ Kiméletes, az állapotának megfelelő mozgás
- ✓ Kerüljük a túlterhelést
- ✓ Figyeljük a jelzéseit



Fogápolás



Senior korban még fontosabb a rendszeres fogápolás.

- ✓ Fogkö eltávolítása
- ✓ Fogágy egészségének megőrzése
- ✓ Megelőzhető a fájdalom és más szervek terhelése



Mire figyeljünk?

- ✓ Fokozott szomjúság, gyakori vizelet
- ✓ Fogys vagy hízás
- ✓ Étvágytalanság, bágyadtság
- ✓ Köhögés, neheztett légzés
- ✓ Sántítás, nehézkes felkelés
- ✓ Tájékozódási zavar
- ✓ Hallás- vagy látásromlás



Otthon tehetünk érte



- ♥ Puha, meleg fekhely
- ♥ Kerüljük a csúszós padlót
- ♥ Használjunk rámpát/lépcsőt
- ♥ Télen figyeljünk a hidegre
- ♥ Szánjunk több időt a közös pihenésre és simogatásra



Tudtad?

A yorkshire terrier a hosszú életű kutyafajták közé tartozik. Nem ritka, hogy 15–16 éves, vagy akár ennél idősebb kort is megél megfelelő gondoskodással.



Fontos!

- ♥ Az apró változások korai felismerésével sok betegség időben kezelhető.
- ♥ A rendszeres odafigyelés, a megfelelő táplálás és a szeretetteljes környezet a legjobb ajándék, amit adhatunk neki.



Gazdi emlékeztető



Az évek múlásával kedvencünk egy kicsit lelassulhat, de a szeretete ugyanakkora marad.

Minden együtt töltött perc felbecsülhetetlen kincs.



„A hűség nem az évek számán múlik, hanem a szív mélységén.”